

Chimiothérapie



par voie orale en pédiatrie

Fiche d'informations spécifiques

Formes pharmaceutiques disponibles

A la pharmacie de ville : PURINETHOL®
Comprimé sécable jaune pâle de 50 mg
Flacon de 25 comprimés. La délivrance se fait en pharmacie hospitalière et de ville.



Mercaptopurine PURINETHOL®

Conservation

Conservation à température ambiante. Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conditions de prescription

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville .



Modalités d'administration



1 prise par jour avec un grand verre d'eau, à distance de lait ou de produits laitiers.
Un intervalle d'au moins 1h avant ou 2h après doit être respecté.



Pour les enfants prenant également du méthotrexate par voie orale, une meilleure activité et une meilleure tolérance sont observées lors d'une administration concomitante PURINETHOL® / Méthotrexate le soir.



Ne pas écraser les comprimés.

Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.
Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.



Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



APHTES

Eviter les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale (brosse à dent souple et dentifrice sans menthol). Utiliser un bain de bouche à base de bicarbonate de sodium. En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contacter le médecin



DIARRHEE ET DOULEURS ABDOMINALES

Eviter les boissons très froides, les fruits et les légumes crus. Privilégier les féculents et bien hydrater l'enfant. Si les symptômes persistent > 48h, contacter le médecin.



AUTRES EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Eruptions cutanées, fièvre due au médicament ...



Une surveillance hépatique est nécessaire avec ce traitement.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.