



# Chimiothérapie

## par voie orale en pédiatrie

### Fiche d'informations spécifiques

#### Conservation

Conservez le flacon soigneusement fermé à température ambiante. Après la première ouverture, le flacon se conserve 56 jours.

Noter impérativement sur la boîte la date de la première ouverture du flacon.



#### Conditions de prescription

Cette suspension buvable doit être prescrite par un médecin spécialiste en hématologie.

#### Formes pharmaceutiques disponibles



Disponible sur prescription hospitalière en pharmacie de ville :  
XALUPRINE® 20mg/ml, suspension buvable, flacon de verre brun sécurisée de 100mL.

#### Seringues à conserver.

Une seringue violette : contenance de 1 ml – graduations 0,01 ml

Une seringue blanche : contenance de 5 ml – graduations 0.2 ml (à utiliser que si doses > 1 ml)



#### Informations à transmettre à votre pharmacie :

Disponible directement auprès du laboratoire : Lucane Pharma

Commande à adresser soit par fax 01 43 71 14 96 soit par courriel [orders@lucanepharma.com](mailto:orders@lucanepharma.com)

Disponibilité sous 48h

Pour toute demande d'information : tel 01 53 86 87 50 ou par courriel: [info@lucanepharma.com](mailto:info@lucanepharma.com)

#### Modalités d'administration



1 prise le soir suivie d'un verre d'eau. Peut être pris lors d'un repas ou à jeun.  
La condition choisie doit être la même tous les jours.




La dose de Xaluprine® doit être prise à distance de lait ou de produits laitiers.  
Un intervalle d'au moins 1h avant ou 2h après doit être respecté.



Pour les modalités d'administration, se référer au guide d'administration à l'attention des patients ou des parents fourni par le laboratoire.



## Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.

## Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

## Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



### APHTES

Eviter les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale (brosse à dent souple et dentifrice sans menthol). Utiliser un bain de bouche à base de bicarbonate de sodium. En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contacter le médecin.



### DIARRHÉE ET DOULEURS ABDOMINALES

Eviter les boissons très froides, les fruits et les légumes crus. Privilégier les féculents et bien hydrater l'enfant. Si les symptômes persistent > 48h, contacter le médecin.



### AUTRES EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Eruptions cutanées, fièvre due au médicament ...



Une surveillance hépatique est nécessaire avec ce traitement.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.