



Chimiothérapie

par voie orale en pédiatrie

Procarbazine

NATULAN®

Fiche d'informations spécifiques

Formes pharmaceutiques disponibles

En pharmacie hospitalière :
Préparation magistrale de gélules au dosage prescrit pour l'enfant.
Disponible sur ordonnance hospitalière.



En pharmacie de ville : NATULAN®
Flacon de 50 gélules jaunes dosées à 50mg.
Disponible sur ordonnance hospitalière ou de ville.



Conservation

Conservation à température ambiante.
Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conditions de prescription

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville .

Modalités d'administration



Prendre le médicament avec un grand verre d'eau.
A la même heure chaque jour, avec ou sans aliments.



Si l'enfant n'arrive pas à avaler les gélules : elles peuvent être ouvertes et le contenu dissout immédiatement dans du jus de fruit, de l'eau ou de la compote. Se reporter à la fiche RESILIAENCE d'informations générales concernant les précautions en cas de manipulation.

Recommandations générales

Limitier la quantité des aliments riches en histamine en raison du risque de réactions hypertensives graves :



- Fromages fermentés : gruyère, brie, roquefort
- Légumes : tomate, choux, épinards
- Fruits : avocat, figue, raisin
- Poissons : harengs marinés, conserves de poisson, poissons fumés
- Chocolat et gibier faisandé



Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.
Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.

Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



CONSTIPATION

Faire boire régulièrement l'enfant, éviter les féculents et préférer les fruits et les légumes riches en fibres.



REACTION ALLERGIQUE

Contactez immédiatement le médecin si vous constatez :
Des boutons ou une rougeur au niveau de la peau
Des difficultés à respirer
Une fièvre

 Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.