

# Chimiothérapie



## par voie orale en pédiatrie

Fiche d'informations spécifiques

### Formes pharmaceutiques disponibles

En pharmacie hospitalière :  
TEMODAL® ou TEMOZOLOMIDE Gé,  
sur ordonnance hospitalière.



6 présentations de gélules disponibles :  
5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg,  
250mg. Les gélules sont conditionnées  
en sachet unitaire par boîte de 5 sachets  
contenant chacun 1 gélule ou en flacon  
de verre contenant 5 gélules.

### Conservation

Conservation à température ambiante.  
Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la  
lumière et de l'humidité.

### Conditions de prescription

Ce médicament doit être prescrit par  
un médecin hospitalier spécialiste en  
oncologie ou en hématologie.



### Modalités d'administration



1 prise par jour, à jeun, avec un grand verre d'eau  
A distance d'au moins 1 heure d'un repas



Si l'enfant n'arrive pas à avaler les gélules : elles peuvent être ouvertes et prises  
immédiatement dans de la compote ou un jus de pomme ou d'orange (MAIS PAS  
DE L'EAU). Se reporter à la fiche RESILIAENCE d'informations générales concernant  
les précautions en cas de manipulation.

### Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.  
Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du  
pharmacien.



## Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

## Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



### APHTES

Eviter les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale (brosse à dent souple et dentifrice sans menthol). Utiliser un bain de bouche à base de bicarbonate de sodium. En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contacter le médecin.



### EFFET CUTANE

Des réactions au niveau de la peau sont possibles. En cas d'apparition, utiliser un savon doux et hydratez la peau de l'enfant.



**Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.**