

Chimiothérapie

par voie orale en pédiatrie



Fiche d'informations spécifiques

Thioguanine

LANVIS®

Formes pharmaceutiques disponibles

En pharmacie hospitalière :
Préparation magistrale, gélule au dosage prescrit pour votre enfant disponible sur ordonnance hospitalière.



Conservation

Conservation à température ambiante. Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.



En pharmacie hospitalière :
LANVIS®

Comprimé de 40 mg conditionné en flacon de 25 comprimés disponible sur ordonnance hospitalière.



Conditions de prescription

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie.

Modalités d'administration



1 prise par jour, avec un grand verre d'eau,
À distance d'au moins 1 heure d'un repas. Éviter la prise avec du lait.



Si votre enfant n'arrive pas à avaler les comprimés : ceux-ci peuvent être dilués dans un peu d'eau de préférence alcaline (exemples Vichy, Saint-Yorre, Badoit, Quezac). Parlez-en au médecin ou au pharmacien.



Si l'enfant n'arrive pas à avaler les gélules : elles peuvent être ouvertes et diluées dans un peu d'eau de préférence alcaline. Se reporter à la fiche RESILIAENCE d'informations générales concernant les précautions en cas de manipulation.

Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.



Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



EFFETS INDESIRABLES CUTANES

Augmentation de la sensibilité au soleil : photosensibilisation.

Utiliser une crème solaire indice de protection 50.



Autres effets moins fréquents

Si votre enfant présente un teint jaunâtre au niveau de la peau ou des yeux, veuillez contacter le médecin.



Une surveillance hépatique est nécessaire avec ce traitement.

Gestion des excréta

Les mesures de protection précisées dans la fiche générale concernant la gestion des excréta s'appliquent pendant la durée du traitement et jusqu'à trois jours après.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.